

ノロウイルスに対しては、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。

消毒液の作り方

床用 (約0.02%次亜塩素酸Na)

ハイター2ml
ペットボトルキャップ
半分弱

水 500ml

【作り方】

- ①ハイターを
ペットボトルキャップ
半分弱入れる
- ②水をボトルいっぱいに入れる



トイレの便座・ドアノブ・手すり・床などの消毒用

汚物用 (約0.1%次亜塩素酸Na)

ハイター10ml
ペットボトルキャップ
2杯分

水 500ml

【作り方】

- ①ハイターを
ペットボトルキャップ
2杯分入れる
- ②水をボトルいっぱいに入れる




便や嘔吐物が付着した衣類や床の浸け置き消毒用

嘔吐物の処理方法



- ① マスク、使い捨ての手袋を着け、おう吐物を、乾燥する前にペーパータオルなどで除去する



- ② ふき取ったペーパータオルはビニール袋に入れて密封する



- ③ おう吐物の付着していた場所を浸すように次亜塩素酸ナトリウム消毒液で消毒する

消毒液は汚物用（約0.1%次亜塩素酸ナトリウム）を使用する



- ④ 使い終わった手袋、マスク、雑巾 2のペーパータオルを入れた袋を、別のビニール袋に入れて密封する
換気は屋内への拡散防止のため、おう吐物処理が終わってから空気の流れに注意して行う



- ⑤ 終わったら、せっけんを使って丁寧に手を洗う